খ. পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

চুন প্রয়োগ

মজুদ পরবর্তী পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি ও সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য মাঝে মধ্যে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। দুই মাস পর পর শতাংশে ২৫০-৩০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করা যায়। শীতের শুরুতে পুকুরে অবশ্যই উক্ত হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

সাত দিন পর পর সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা এবং পানির রঙের উপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগ করা ভালো।

সারের ধরন	শতাংশে ব্যবহার মাত্রা (প্রতি সপ্তাহে)
গোবর সার অথবা কম্পোস্ট	১-২ কেজি
ইউরিয়া	৫০-১০০ গ্রাম
টিএসপি	২৫-৫০ গ্রাম

উল্লেখিত মাত্রায় সার প্রয়োগে যদি পরিমিত প্রাকৃতিক খাবার না জন্মায় তবে প্রতি শতাংশে ৩০০ গ্রাম খৈল তিনগুণ পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরবর্তীতে ১০০ গ্রাম ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আবার যদি বেশি সবুজ হয় তবে সার প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে।